

Zur genauen Beurteilung Ihrer Erkrankung benötigen wir einen Sammelurin über 24 Stunden.

Was Sie dafür benötigen:
(Behälter müssen nicht steril sein)



24h-Sammelbehälter
(in der Apotheke erhältlich)



Beliebiger Auffangbehälter
für den Urin



Beliebiges verschließbares
Gefäß (mind. 100 ml)

Vorgehensweise:

1.



24
STUNDEN

Entleeren Sie am Morgen nach dem Aufstehen wie gewohnt den Inhalt Ihrer Blase in die Toilette (nicht ins Sammelgefäß). Notieren Sie sich die Uhrzeit. Die Sammlung wird am nächsten Tag zur gleichen Uhrzeit beendet.

2.



Sammeln Sie den gesamten Tag über und auch in der folgenden Nacht jeden weiteren Urin mit dem Auffangbehälter und füllen Sie ihn in den 24h-Sammelbehälter. Lagern Sie den Urin bitte kühl. Den letzten Urin sammeln Sie am nächsten Morgen zu der am Vortag notierten Uhrzeit. Die Sammlung ist damit beendet.

Sollten Sie versehentlich eine Urinprobe nicht gesammelt haben, bitte neu beginnen!

3.




Lesen Sie die gesammelte Menge an der Skala der Sammelflasche ab oder ermitteln Sie diese mithilfe eines Messbechers. Notieren Sie die Gesamtmenge auf einem Zettel.

4.



Füllen Sie 50 – 100ml der Sammelmenge in ein kleines verschließbares Gefäß und notieren Sie darauf die Gesamtmenge. Den Rest des Sammelurins können Sie wegschütten.

5.



Geben Sie das kleine Gefäß in der Praxis am gleichen Tag ab. Die Abgabe ist mit einer Blutuntersuchung verbunden.